

# Enfermedades y planes sanitarios




Pasantías en la UPC 2015

**Gustavo Castro**

E-mail: [gucastro@mgap.gub.uy](mailto:gucastro@mgap.gub.uy)

Cohabitación animal - animal



Cohabitación animal doméstico – animal silvestre



Cohabitación animal - hombre



# Enfermedades relevantes

1) Enfermedades de la lista de OIE.



2) Enfermedades de importancia en la producción.



3) Enfermedades zoonóticas.





## Enfermedades de la lista de OIE

### Comunes a varias especies

- Brucelosis.
- Carbunco.
- Encefalitis japonesa.
- Enfermedad de Aujeszky.
- Equinococosis/hidatidosis.
- Fiebre aftosa.
- Rabia.
- Triquinelosis.

### Específicas del cerdo

- Cisticercosis.
- Encefalomielitis por virus Nipah.
- Gastroenteritis transmisible.
- Peste Porcina Africana.
- Peste Porcina Clásica.
- PRRS.






## Enfermedades de importancia productiva

- 
- Complejo Respiratorio Porcino.
  - Complejo Entérico Porcino.
  - Circovirus.
  - Micotoxicosis.
  - Parvovirus.
  - Parasitosis.



## Enfermedades zoonóticas



- Influenzas.
- Leptospirosis.
- Streptococcus suis.
- Toxoplasmosis.



# Planes sanitarios

## Bioseguridad

- Múltiples sitios.
- Cercado perimetral.
- Control de acceso.
- Rodiluvios y pediluvios.
- Vacío sanitario.
- Control de roedores, moscas y pájaros.
- Cuarentena: días y lugar.





# Vacunación

- **Decisión**
  - Obligatoria.
  - Por problemas en el país.
  - Por problemas en el criadero.
  - Ocasionales.
- **Planes**
  - Categorías.



## Lechones, recria y terminación

- Micoplasma: 1 y 3 semanas.
- Circovirus, Enfermedad de Glässer, Rinitis atrófica: 3 y 6 semanas.
- APP e Influenza: 4-5 y 8 semanas.




## **Madres**

- Parvo-Lepto-Erisipela: 4 y 2 semanas pre-servicio. Luego semestral.
- Circovirus y Micoplasma: 6 y 2 semanas pre-parto. Luego semestral.
- APP, E. Coli e Influenza: 4 y 2 semanas pre-parto. Luego semestral.

## **Verracos**

- APP, Influenza y Leptospira: semestral.



## Desparasitación

- **Decisión**

- Análisis coprológico.
- Monitoreo: faena, necropsia.

- **Planes**

- Ivermectina


Lechones, recria y terminación: 1 y 3 semanas (destete), 4 meses.

Madres: 1-2 semanas pre-parto. Luego semestral.

Verracos: semestral.

Ración: durante 7 días.

Tiempo de espera.




## Antibióticoterapia

- **Uso**

- Promotor de crecimiento.
- Preventivo: agua o ración.
- Terapéutico.

- **Planes**

- Según enfermedad.
- Antibiograma.



**Muchas gracias**



**Portada:**

Detalle de “Los cerdos negros”  
Paul Gauguin, francés, 1848-1903